

本草品彙精要

本草品彙精要卷之三十二

果部上品

六種神農本草經

朱字

五種名醫別錄

黑字

二種宋本先附

注云宋附

二種今分條

五種陳藏器餘

已上總二十種

荳莞

花山薑
花附

藕實莖

石蓮荷
葉花鼻

橘

核皮
附

青皮

原附橘下
今分條

柚

原附橘下
今分條

大棗

生棗及
葉附

仲思棗

宋附苦
棗附

葡萄

栗

蓬蘽

力軌
切

覆盆子

芟

音實
枝也
菱角

橙子

宋附

櫻桃

雞頭實

五種陳藏器餘

靈床上果子

無漏子

都角子

文林郎子

木威子

本草品彙精要卷之三十二

果部上品

果之草

荳蔻

無毒附花
山薑花

植生

荳蔻主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣

名醫所錄

名

草荳蔻

苗

圖經曰

荳蔻卽草荳蔻也苗似蘆葉似山薑杜若輩

根似高良薑微有樟木氣花作穗嫩葉卷之而生初

如芙蓉穗頭深紅色葉漸展花漸出而色漸淡亦有

黃白色者其實若龍眼子而銳皮無鱗甲中子若石

榴鮮南人採當果實尤貴其嫩者并穗入鹽同淹治

疊疊作朶不散落又以木槿花同浸欲其色紅耳聞

中一種亦名草荳蔻子白似縮砂子殼如山梔但味
淡不香東垣治胃口痛者此也又有一種山薑花味
辛性溫莖葉皆薑但根不堪食亦與荳蔻花相似而
微小耳花生葉間作穗如麥粒嫩紅色南人取其未
大開者謂之含胎花以鹽水淹藏入甜糟中經冬如
琥珀色香辛可愛用其鱸醋最相宜也二種苗葉小
異而治療亦各圖經曰生南海有功效併載之地今嶺南皆有之時生春生苗收採十月取乾

用

實

色

蒼

味

辛

性

溫

氣

氣之厚

臭

香

主

溫中

行

足太

陰經

陽明

製

雷公云凡使須去蒂并向裏子後取皮用茱

萸同於鐵上緩炒待茱萸微黃黑去茱萸取

草荳蔻皮及

治

療

唐本注云

下氣止霍亂

藥性論云

子杵用之

一切冷氣

日華子云

荳蔻花下氣

止嘔逆除霍亂調中補胃氣消酒毒○山薑花調中

下氣消食

陳藏器云

山薑去惡氣溫中中惡霍亂心

腹冷痛。草荳蔻煨熟治風寒客邪在胃口之上及脾胃客寒心與胃痛

藕實

無毒

泥生

藕實莖主補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老

不饑延年

神農本草經

名

水芝丹

蓮

苗

圖經曰

詩傳云荷芙蕖也總名曰荷

其莖曰茄未出水者曰銀條其葉曰蓮葉中蒂謂之荷鼻其本曰蓊蓊即莖下白莖在泥中者也芡曰芙蓉秀而未發曰菡萏已發暢茂曰華其實曰蓮蓮謂房也其中葯乃蓮肉青皮白實爾中有青爲薏即所謂苦如薏也其根曰藕花有紅白二種白者藕大實小紅者藕小實大千業者皆不實然則生於水而水不能沒雖居於淤泥而泥不能淤其體中空食之故能令人心悅也

地

圖經曰生汝南池澤江南今處

處有**時**生三月四月生**採**八月九**收**日用**藕實莖葉**
之**苗**六月開花**月取實**乾**帶房薏即**

花**色**白黃**味**甘**荷鼻****性**平寒緩**藕****氣**氣之薄者**臭**香**主**
苦藕甘**溫花暖****陽中之陰**

清**心****製**剝去黑殼**治**療**圖經曰**止痢定腰痛及噦
止痢**碎去心用**逆。藕主霍亂後虛渴煩

悶不敢食。葉止渴。荷鼻安胎去惡血留好血**日**
華子云止渴助心止痢多食令人喜。藕止霍亂開

胃消食除煩止悶口乾渴疾止怒破產後血悶搗罾
金瘡并傷折止暴痛蒸食開胃。薏止霍亂。葉落

胞并產後口乾心肺燥煩悶**藥性論云**補**圖經曰**輕
藕消淤血不散。節止口鼻吐血**身益氣令**

人强健。花鎮心益顏色**藥性論云**主五臟不足傷
中氣利益十二經脉血氣**陳藏器云**令髮變黑不白

日華子云止洩精安**滄**合蠟蜜為丸服令人不饑。
心。花輕身駐顏**葉及房合酒煮服治產後胎**

衣不下。即合生地黄汁熱酒童便能解熱毒消淤血產後血悶。食生食微動氣。○**忌**花忌地黃生蒜**解**葉殺蕈毒及食蟹中實生食脹人腹。毒水煮服之。○藕解酒毒。

果之木

橘 無毒

植生

橘 出神農本經 主胸中瘕熱逆氣利水穀久服去臭下氣

通神 以上朱字 神農本經 下氣止嘔欬除膀胱留熱停水五淋

利小便主脾不能消穀氣衝胸中吐逆霍亂止洩去

寸白輕身長年

以上黑字
名醫所錄

名

橘皮 塌橘

朱橘 山橘

苗

圖經曰
木高丈

餘葉與枳無辨刺出莖間夏開白花六七月成實至冬黃熟噉之甚甘美。謹按青橘黃橘青者味苦而

小六七月未成熟時採之以刀劃開暴乾者謂之蓮花青皮至十月霜降後已成熟者味辛而黃大謂之

橘皮醫家所用陳皮即經久者是也蓋二藥功用雖殊實出一種舊本橘柚同條然橘與柚自是二種功

用既殊性味亦異**地**圖經曰生南山川谷及江南今其柚故析條于左**地**江浙荆襄湖嶺皆有之**道地**廣

東**時**生春生採十月**收**暴**用**肉核皮陳**質**類**色**黃**味**新葉取實乾久者良

辛**性**溫**氣**氣厚於味**臭**香**主**留白者和胃調中去白者消痰下氣**行**太

陰經足**助**白檀為**製**去穢細**治**療藥性論云皮除胸太陰經之使**判**用**治**膈間氣開胃氣痢

消痰涎止上氣欬嗽日華子云橘止消渴開胃去胸中膈氣。皮消痰止嗽破癥瘕瘰癧。橘囊上筋膜止渴及吐酒陳藏器云橘止倉合白朮補脾胃。合洩痢下食開胃膈痰結氣甘草補肺氣。合葛根茯苓甘草生薑治氣逆上而不解皮食魚饜柚皮下。核合酒服治腰痛膀胱腎冷解毒中毒皺子皮爲偽

青皮

無毒

植生

青皮主氣滯消食破積結膈氣

名醫所錄

名

乳橘

苗

謹按本經二橘

通云味辛又云一名橘皮又云十月採都是今之黃橘也後人由其味辛苦其形大小遂以爲二種今則各立其條便於治用蓋青皮卽青橘皮也實與黃橘同種由其所採時月生熟及體色性味不同故攻疾

有異其霜後採黃大已穰而味辛者謂之黃橘則入脾胃走肺氣六七月未成熟時採青小未穰而味苦者謂之青皮則入厥陰少陽踈肝氣正如枳殼枳實同種枳殼治高以其性詳而緩枳實治低以其性酷而烈之

地

圖經曰生南山川谷及江南今江浙荆襄湖嶺皆有之道地廣東

時

生春

故也

新採

六七月

收

暴乾

用

實刀劃蓮花辦者佳

色

青黑

味

辛苦

性

寒洩

氣

薄

葉

取實

收

乾

用

實刀劃蓮花辦者佳

色

青黑

味

辛苦

性

寒洩

氣

薄

味厚

臭

香

主

消堅

攻滯

行

手少陽經

製

去穰剉

倉

合

陰也

製

碎用

倉

葱

白童便煎服治婦人產後氣逆合酒調末服治吹乳不癢不痛腫硬如石

禁

多服則損真氣

柚子

無毒

植生

柚子主妊孕人喫食少并口淡去胃中惡氣消食去

腸胃氣解酒毒治飲酒人口氣

名醫所錄

苗

圖經曰木蒿丈許葉與枳

無辨刺生莖間夏初開白花六七月成實至冬黃熟時亦可噉其實似橙而酢大於橘但皮厚不堪入藥衍義曰橘柚自是兩種一名橘皮是元無柚字豈有兩物而治療無一字別者即知柚之一字為誤後人不深求其意為柚字所惑妄生分別且青橘與黃橘治療尚別矧柚為別種也郭璞云柚似橙而大於橘且柚皮極苦乃不堪嘗皮甘者乃橙耳人以柚為橘者誤矣原本橘柚同條混淆欠明今則分為二種矣

地

圖經曰生南山山谷及江南今江浙荆襄湖嶺皆有之

時

生春生採十月取實

收

去肉

用

質

類香橙而大

色

黃

味

甘酢

性

寒緩

氣

味厚於氣陰中之陽

臭

香

主

消食和胃

治

療陶隱居云下氣

解

酒毒

大棗無毒

植生

大棗出神農本經主心腹邪氣安中養脾助十二經平胃

氣通九竅補少氣少津液身中不足大驚四肢重和

百藥久服輕身長年○葉溫無毒覆麻黃能令出汗

以上朱字神農本經補中益氣強力除煩悶療心下懸腸澀不

饑神仙○三歲陳核中仁燔音煩之味苦主腹痛邪氣

以上黑字名醫所錄名御棗 良棗 遵羊棗 臙臙棗 美
牙棗 水菱棗 波斯棗 乾棗

壺棗 洗大棗 羊矢棗 邊腰棗 哲無實 苗圖
蹶洩苦棗 濟白棗 天蒸棗 撲落酥 經

曰大棗乃乾棗也其木高三五丈枝上多刺如鍼四月發萌漸生葉至五月開花黃白色七八月結實熟則紫赤郭璞注爾雅云壺棗者由其大而銳上者爲壺壺猶瓠也邊大而腰細者爲邊腰棗亦謂之轆轤棗棗白熟者謂之擠實小而圓紫黑色者謂之遵俗呼爲羊矢棗是也出河東猗氏縣如雞卵最大者謂之洗味苦者謂之蹶洩不著子者謂之哲還味稔棗謂其味之短者也南人蒸熟暴乾皮薄而皺味更甘美於他者謂之天蒸棗然其種類圃人亦不能別其名入藥以青州者最佳雖晉絳大實亦不及青州者之肉厚也又廣州一種波斯棗木無傍枝直聳三四丈至巔四向共生十餘枝葉如樓櫓彼土人呼爲海樓木三五年一著子都類北棗味極甘而差小然其核兩頭不尖雙卷而圓爲異也又有水菱棗御棗之類其味甚美但肌實輕虛暴服之則枯敗

地

圖經曰

生河東

平澤今近北州郡及江南廣州皆有之陶隱居云出鬱州及東臨沂金城道地青州晉州絳州為佳時

生四月採八月收暴用實葉色紅味甘性平氣厚者

陽也臭香主和中製蒸熟去皮核用治療唐本注云葉揩熱癰

心肺止嗽除腸胃癰氣。葉小兒壯熱煎湯浴孟詵云乾棗潤

云乾棗治心腹邪氣通九竅。核中仁祛惡氣卒疰忤補日華子云乾棗補五臟虛勞損孟詵云乾棗補

虛強志補不足氣助腸胃肥中別錄云調中益

脾氣令人好含合光粉燒療疳痢。葉禁中滿牙齒

顏色美志氣合葛粉揩癰子及熱瘡痛者勿食

亦不宜合生葱食。葉服之使人瘦久即嘔吐。解

生棗味甘辛多食令人多寒熱羸瘦者不可食

和百藥毒

殺烏頭毒

仲思棗無毒

仲思棗主補虛益氣潤五臟去痰嗽冷氣久服令人

肥健好顏色神仙不饑名醫所錄苗圖經曰形如大棗長一二寸正紫色細文

小核味甘重北齊時有仙人仲思得此棗因以為名

隋大業中信都郡嘗獻數顆近世稀復有之又千

年棗生波斯國亦稍溫補非此之儔也地圖經曰出信都郡收暴乾用實質形如大棗

果之走

葡萄無毒

蔓生

葡萄

出神農本經

主筋骨濕痺益氣陪力強志令人肥健

耐饑忍風寒久食輕身不老延年可作酒

以上朱字神農本經

逐水利小便

以上黑字名醫所錄

苗

圖經曰苗作藤蔓而極長大盛者一二本綿被山谷

間花極細而白色其實有紫白二色然形之圓銳亦有二種其江東出者實細而味酸謂之蔓莢子是山葡萄也皆七八月熟取其汁可以釀酒其根苗中空相通圃人將採實貨之欲得厚利暮漑其根而晨則水溢子中矣故俗亦呼其苗為木通也漢張騫使西域得其種而還中國始有蓋北果之最珍者魏文帝詔羣臣云醉酒宿醒掩露而食甘而不飴酸而不酢冷而不寒味長汁多除煩解悁他方之果寧有匹之者乎

地

圖經曰生隴西五原燉煌山谷今河東近京州郡皆有之

時

生三月苗四月花隨結實

採七月八月**收**暴**用**實**質**類馬**色**紫**味**甘**性**平**氣**氣之

月取實**乾**根**乳**白**緩**薄者

陽中**臭**香**主**除濕痹**製**根煮**治**療藥性論云實除腸

之陰**利**水道**汁**根煮**間**水氣調中止淋

通小便**孟**詵云根止嘔噦及霍亂後惡**滄**實合酒飲

心妊孕人子上衝心煮汁飲胎即下安**治**時氣發

瘡癰不**禁**子不堪多食令

出者**人**卒煩悶眼闇

果之木

栗子無毒

植生

栗子主益氣厚腸胃補腎氣令人耐饑**名**醫**名**皮**苗**

圖經曰樹高二三丈極類櫟花青黃色似胡桃花實

有房彙其彙大若拳者中子三五枚小若桃李者中

子惟一二將熟則罅折子出栗之種類亦多陸機疏云栗五方皆有之周秦吳楊特饒吳越被城表裏皆栗惟濮陽及范陽栗甜美味長他方者悉不及也倭韓國諸島上栗大如雞子亦短味不美桂陽有莘而叢生實大如杏子中仁皮子形色與栗無異也但差小耳又有奧栗皆與栗同子圓而細或云卽莘也今此色惟江湖有之又有茅栗佳音栗其實更小而木與栗不殊但春生夏花秋實冬枯爲異爾栗房當心一子謂之栗楔治血尤効陶隱居云今會稽最豐諸暨音栗形大皮厚不美刻時及豐皮薄而甜相傳有人患脚弱往栗樹下食數升便能起行此是補腎之義然應生噉之若餌服則宜蒸暴也

地
經圖

曰舊本不著所出州土今山陰處有之道地兖州宣州者最勝

時
生春生葉夏開花秋結實

採
九月取實**收**
暴用實**色**
殼紫肉黃白**味**
鹹**性**
溫**氣**
氣厚於味

臭

微香

主

腎虛脚弱

製

去殼

治

療

圖經曰殼止反胃及消渴。木皮消瘡毒唐本注云栗作

粉塗瘡上及筋骨斷碎疼痛腫瘀血。毛殼除火丹毒腫。樹白皮療溪毒日華子云生栗破冷瘡癖生

嚼罽惡刺箭頭不出者并傳補孟詵云栗日中暴瘰癧腫毒痛。殼止瀉血乾食下氣補益

倉

栗上薄皮合蜜塗面展皺禁小兒不可多食生者難化熟即滯氣

齒不生。患風水氣不宜食

果之草

蓬蘽

無毒

叢生

蓬蘽

出神農本草經

主安五臟益精氣長陰令堅強志倍力

有子久服輕身不老

以上朱字神農本經

療暴中風身熱大驚

以上黑字

名醫所錄

名

陵藁

陰藁

西國草

苗

圖經曰蓬藁

畢楞伽

子覆盆

卽覆盆子之

苗莖也蔓短不過尺莖葉皆有刺花白子黃赤色形如半彈丸而下有莖承之如柿蒂狀小兒多食其實

江南人謂之葍然其地所生差晚而功用則同古方用葉汁滴目中去膚赤有蟲出如絲線者是也唐本

注云蓬藁覆盆一物異名亦如蜀漆與常山異條芎藭與藤蕪各用今以附入果部者蓋其子是覆盆故

也

地

圖經曰生荆山平澤及冤句今處處有之秦吳尤多

時

生春生採五月

取苗不拘

收

暴乾

用

葉

色

青

味

酸

性

平

氣

味厚於氣陰中之陽

臭

香

主

益精強志

製

搗碎或按汁用

治

補別錄云耐寒

濕好顏色

覆盆子

無毒

叢生

覆盆子主益氣輕身令髮不白

名醫所錄

名

縣鉤子

苗

行義曰覆

盆子四五月紅熟山中人採來賣者其味酸甘外如荔枝櫻桃許大紅輒可愛失採則枝上就生蛆益腎臟縮小便服之當覆其溺器如此取名食之多熱收時須乘五六分熟便可採於烈日中暴仍須薄綿蒙裹着水則不堪用也**地**圖經曰生荆山平澤及冤句今處處有之秦吳地尤多**時**生三月

採

五月取實

收

暴乾

用

實於麥田中得者良

色

紅

味

甘

性

平

氣

氣厚於

之

臭

朽

主

補肝明目

滋陰駐顏

製

雷公云凡使用東流水淘去黃葉并皮蒂盡了用酒蒸一

宿以東流水淘

治

療

日華子云

主

中風身熱及驚

補

別錄云熬湯服平肺虛寒

兩遍曬乾用

唐本注云補虛續絕強陰健陽悅澤肌膚安和臟腑和中益力療勞損風虛補肝明目藥性論云療男子腎精虛竭女人食之有子日華子云益顏色養精氣長髮強志陳藏器云令人好顏色合人乳浸點目中治眼暗不見物冷淚浸淫青盲天行目暗等疾

果之走

芰實

無毒

浮生

芰音技實主安中補五臟不饑輕身

名醫所錄

名

菱浮菱水菱菱

角

苗

圖經曰

芰菱實也葉似荇浮在水面花黃白色

晝合夜開隨月轉移猶葵之向日也花落而實

生實有紅綠二種潛向水中成熟南人取莖淹作菹食之然腫亦多有四角者有二角者其皮嫩謂之浮

菱生食之味尤甘美楚人謂之芰秦謂之薢茳今俗
謂之菱江淮及山東人暴其實以為米可以當糧衍
義曰芰今世俗謂之菱角煮食可以代糧然不益脾
又有水菱亦芰也但大而脆可生食修合治療未聞
其地圖經曰生廬江江南
用地山東今處處有之

暴用實
色肉殼青紅
味甘
性平
氣冷
臭香
主補
乾用肉白

臟倉蒸作粉合蜜漬
禁多食令人腹脹滿用煖酒和
食之以斷穀

多食令人陰不强生者不
宜多食令人臟冷損陽氣
解丹石
毒

果之木

橙子皮無毒

植生

橙子皮作醬醋香美散腸胃惡氣消食去胃中浮風

氣○瓢味酸去惡心不可多食傷肝氣

名醫所錄
苗
圖經曰樹

似橘而葉大實亦類橘但皮厚皺而尤香耳八月熟採食之衍義曰橙子皮今人止以爲果或取皮合湯

待賓未見地
圖經曰生南山川谷及江南
時
生夏開

人藥也
採
八九月
收
暴乾
用
皮類橘皮
質
厚多皺
色
黃
味
辛苦
性
溫
氣
厚

取實
味薄陽
臭
香
主
消食理氣
治
療別錄云散癰
倉
合鹽蜜食

中之陰
禁
多食發虛熱及癰癰與
解
殺魚
風
心胃
獮肉同食發旋惡心
蟲毒

櫻桃
微毒

植生

櫻桃主調中益脾氣令人好顏色美志

名醫所錄名朱菓臘櫻

朱菓 荆桃 李桃 柰桃 含

苗 圖經曰其木多

桃 紫桃 麥甘酣 山朱櫻

陰最先百果而

熟故方多貴之其實熟時深紅色者謂之朱櫻正黃明者謂之臘櫻其大若彈丸核細而肉厚者尤難得也衍義曰此即古謂之含桃可薦宗廟禮記云先薦寢廟者是也於四月初熟得正陽之氣先諸果而熟其性故熟今西洛一種紫櫻至熟時正紫色皮裏間有細碎紫黃點此為最珍藥中不甚須也地

曰處處有之道地

時生春生探

四月

實

色紅

味甘

洛中南都者最勝

葉

取實

用

性

熱氣

氣厚味薄

臭香

主

調中

治

療

圖經曰美顏色

白蛇蟲

唐本注云

葉搗傅蛇咬并絞汁服

禁

關風人不可噉

防蛇毒內攻

別錄云

止水穀痢及洩精

嗽之立發小兒多食發熱及嘔吐

果之走

雞頭實

無毒

浮生

雞頭實主濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志

令耳目聰明久服輕身不饑耐老神仙

神農本草經

名

鴈啄實

芡 鴈頭

苗

圖經曰葉大如荷皺而有刺浮在水面謂之雞頭盤花下結實有彙大如拳形

蓂菜

類雞頭故以名之芡即彙中子也江南產者其彙紅紫光潤無刺自揚而北產者彙有刺而青綠為異其

莖

公幸切

之嫩者名薺切

為詭

荻人採以為菜茹

衍義

曰雞頭實今天下皆有之河北沿塘樂居人採得春

去皮搗仁爲粉蒸潔作餅可以代糧多食不益脾胃氣蓋難消化也

時生春生採八月**收**暴**用**實**質**類雞**色**殼青**味**甘

性平**氣**氣厚於味**臭**微**主**補中**製**別錄云蒸熟於烈

亦可春**治**療別錄云根除小腹結**補**日華子云**倉**擣

合金櫻子煎爲**禁**小兒多食不能長**補**益下氣**大**生食動風冷氣

五種陳藏器餘

靈床上果子主人夜臥讖語食之差也。無漏子味

甘溫無毒主溫中益氣除痰嗽補虛損好顏色令人

本草綱目卷之二十一
肥健生波斯國如棗一云波斯棗

○海藥云

樹若栗木其實如橡子有三角消食止咳嗽虛羸悅人久服無損也

都角子味酸澀平無毒久食益氣止洩生南方樹高丈餘子如卵徐表南方記云都角樹二月花花連著實也

○海藥云

謹按徐表南州記云生廣南山谷二月開花至夏末結實如卵主益氣安神遺洩痔溫腸久服無所損也

文林郎味甘無毒主水痢去煩熱子如李或如林檎

生渤海間人食之云其樹從河中浮來拾得人身是
文林郎因以此爲名也

○海藥云

又南山亦出彼人呼楹梓是味酸香微溫
無毒主水瀉腸虛煩熱並宜生食散酒氣
也

木威子味酸平無毒主心中惡水水氣生嶺南山谷
樹葉似楝子如橄欖而堅亦似棗也

本草品彙精要卷之三十二

本草品彙精要卷之三十三

果部中品

一種神農本草經

朱字

六種名醫別錄

黑字

二種唐本先附

法云唐附

三種宋本先附

法云宋附

一種今移

四種陳藏器餘

已上總一十七種

內四種今增圖

梅實

葉根核仁烏梅白梅附

木瓜

模樗附

柿

蒂附

芋

葉附

烏芋

茨菇

剪刀草也自外經今移

枇杷葉

子附

荔枝子

宋附

乳柑子

宋附

甘蔗

音柘

石蜜

乳糖也唐附

沙糖

唐附

棐

音卑

柿

宋附

四種陳藏器餘

摩厨子

懸鈎

鈎栗

石都念子

本草品彙精要卷之三十三

果部中品

果之木

梅實

無毒附烏梅白梅

植生

梅實

出神農本草經

主下氣除熱煩滿安心肢體痛偏枯不

仁死肌去青黑誌惡疾

以上朱字神農本草經

止下痢好唾口乾

以上黑字名醫所錄

苗

謹按木似杏而枝幹勁脆春初時開白花甚清馥花將謝而葉始生二月結實

如豆味酸美人皆啖之五月採將熟大於杏者以百草烟熏至黑色爲烏梅以鹽淹暴乾者爲白梅也

地

圖經曰生漢中川谷今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有之道地郢州今安吉為勝

時

生春初

二月

採

五月

收

火用

實

質

類杏

色

生青

味

酸

結實

取實

乾

實

質

實

色

熟黃

味

性

平

氣

氣之薄者

臭

香

主

生津止渴

製

去核

治

療

圖經曰葉

陽中陰也

息痢。根除風痺。烏梅治傷寒煩熱及霍亂燥渴

虛勞瘦羸產婦氣痢陶隱居云白梅點痣蝕惡肉唐

本注云實利筋脉去痺藥性論云核除煩熱日華子

云實止渴。葉止霍亂。白梅傳刀箭所傷及刺在

肉中。烏梅除勞及骨蒸去煩悶澀腸消酒毒并偏

枯皮膚麻痺去黑點令人得睡陳藏器云烏梅消痰

祛瘧瘴調中止吐逆孟詵云大便不通氣奔欲死烏

梅湯泡按去核杵丸如棗大內下部即通湯液本草

云烏梅燒灰傳一

切瘡肉出及虻蟲

倉

烏梅合建茶乾薑為丸止休息

痢。合蜜為丸石榴皮根湯下

治傷寒下部生蠶瘡**禁**服黃精不宜食。多啖傷骨蝕脾胃發

人膈上熱

木瓜

無毒附
檳櫨

植生

木瓜實主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦

可養用

名醫所錄

名

楸

苗

圖經曰其木狀若柰花生於春末而深紅色其實大者如瓜小

者如拳味酢可食爾雅謂之楸宣州人種蒔尤謹遍滿山谷始實成則鏤紙花薄其上夜露日暴漸而變紅花文如生本州以克上貢焉又有一種檳櫨一名蠻植木葉花實酷類木瓜陶云欲辨之看蒂間別有重蒂如乳者為木瓜無此者為檳櫨也木瓜大枝可作杖策利筋脉又截其木乾之作桶以濯足尤益陶

隱居云彼人以爲果最療轉筋如轉筋時地圖經曰

但默呼其名及書木瓜字於患處卽愈舊不著

所出州土今山陰蘭亭尤多生春末採秋取

處處有之道地宣城爲佳時開花實收乾暴

用實質類檳櫨子色赤味酸性溫氣厚於味臭香

主除脚氣行手足太製雷公云凡使勿令犯鐵用銅

曬却用黃牛乳汁拌蒸從已至未其治療圖經曰實

木瓜如膏煎却於日薄攤曬乾用治有酒去痰

○根及葉煮湯淋足脛止蹙陶隱居云凡轉筋呼木

瓜及書二字於患處卽愈日華子云木瓜止吐瀉賁

純及水腫冷熱痢心腹痛消渴嘔逆心膈痰唾○根

及實除脚氣○檳櫨消痰解酒毒及咽酸浸油梳頭

治髮赤并白陳藏器云木瓜下冷氣強筋骨消食止

水痢後渴不止○檳櫨去惡心止心中酸水水痢止

酒痰水衍義曰木瓜入肝故益筋
倉合酒煮木瓜爛
與血病腰腎脚膝無力不可缺
研裹膝筋急痛

禁
食損齒及骨
解
酒毒
質
和圓子蔓子
土伏子爲偽

柿 無毒
植生

柿主通鼻耳氣腸癖不足
名醫所錄
名
牛奴柿 紅柿
朱柿 牛心柿

蒸餅柿 烏柿 白
小柿 塔柿
苗
青葉類梨葉而圓大夏開青

白花其實結於花心至秋漸大而熟柿之種類甚多
黃柿生近京州郡紅柿南北通有朱柿出華山似紅
柿而皮薄更甘珍音柿出宣歙荆襄閩廣諸州但
可生噉不堪乾也諸柿食之皆美而益人其乾柿火
乾者謂之烏柿出宣州越州性甚溫日乾者謂之白
柿入藥微冷又有一種小柿謂之軟棗俚俗暴乾貨

之謂之牛妳柿其枯葉至滑澤古人取以臨書俗傳
柿有七絕一壽二多陰三無鳥巢四無蟲蠹五霜葉
可翫六嘉實七落葉肥大衍義曰柿有著蓋柿於蒂
下別生一種又牛心柿如牛之心蒸餅柿如今市賣
之蒸餅華州有一等朱柿比諸品中最小深紅色又
一種塔柿亦大於諸柿性皆涼不至大寒食之引痰
極甘故也去皮掛大木株上使風日中自乾食之動
風火乾者味不佳生則澁以溫水養之需澁去可食
逮至自然紅爛澁圖經曰舊不著所出州土今近
亦自去乾則性平地京州郡及華山宣州越州南北
皆有時生春生採秋熟取實收暴乾用實色紅味甘性寒
之

氣

氣薄味厚
陰中之陽

臭

香

主

止吐血
厚腸胃

製

火熏并
暴乾用

治

療日華子
云潤心

肺止渴澁腸療肺痿心熱嗽消痰開胃。乾柿潤聲
喉殺蟲陳藏器云多食去面肝除腹中宿血。蒂止

噦氣唐本注云火柿金瘡火瘡生肉止痛。軟補孟

熟柿止口乾壓胃間熱孟詵云乾柿消宿血詵

云乾柿虛勞不足健脾澹黃柿合米粉作糗食小兒

胃氣。紅柿續經脉氣澹止痢。乾柿合酥蜜煎食

治脾胃薄食。木皮擣末合米飲和禁牛妳柿性冷

服治下血不止亦止上衝下脫者禁不可多食。

凡食柿不可與蟹同解酒毒

食令人腹痛大瀉解毒

果之草

芋有毒

叢生

芋主寬腸胃克肌膚滑中

名醫所錄名芋土芝白芋青

芋苕圖經曰葉如荷葉而長根類山藥而圓其

紫芋苗種類雖多大抵性效相近蜀川出者形圓

而大狀若蹲鴟謂之芋魁三年不採者謂之莒彼人
蒔之最盛可以當糧食而度饑年左思三都賦所謂
徇蹲鴟之沃則以爲濟世陽九是也江西閩中出者
形長而大葉皆相類甚細者如雞卵生於大魁傍食
之尤美不可過多乃有損也凡食芋並須園圃蒔者
爲佳其野芋生溪澗非人所種者根葉亦相類不堪
食也唐本注云此有六種有青芋紫芋真芋白芋連
禪芋野芋其青芋毒多初煮要須灰汁易水煮熟乃
堪食爾白芋真芋連禪芋紫芋毒少蒸煮噉之兼肉
作羹亦佳蹲鴟之饒蓋此謂也野芋有大毒而不可
噉衍義曰江浙二川者最大而長京洛者差圓而小
惟東西京者佳他處味不及也當心出苗者爲芋頭
四邊附芋頭而生者爲芋子八九月已後可食至時
掘出置十數日陰以好土勾埋至春猶好生則味辛
而涎多過食亦地圖經曰錢塘最多閩蜀淮南尤殖
能滯氣困脾也地今處處有之衍義曰江浙川廣最

佳

時

生春生採

入九月已

收

曬

用

根

色

紫青

味

辛

性

苗

後取根

乾

白

味

性

平

氣

氣之薄者

臭

朽

主

止煩熱

製

蒸煮熟

治

療

日華子

云芋破

宿血去死肌。

葉止瀉及妊孕心煩迷悶胎動不安

陳藏器云

小者開胃及腸閉產後煮食破血及飲汁

止血渴

孟詵云

紫色者破

補

陳藏器云

食

倉

野芋合

氣作湯浴去身上浮風

之令人肥白

倉

醋摩傳

蟲瘡疥癬。薑芋合生薑并魚煮食下氣調中補虛

。芋葉合鹽研傅蛇蟲咬并癰腫毒及畧傳箭毒

禁

久食令人虛勞無力滯氣困脾冬月宜食他時

解

中野芋毒惟土

漿及糞汁解之

烏芋

無毒

叢生

烏芋主消渴瘴熱溫中益氣

名醫所錄

名

藉姑 烏莢

水萍 芍 了

苗

圖經曰烏芋今烏莢也苗似龍鬚而細正青色根黑如指大皮厚有毛又有一種皮薄無毛者亦同

田中生人並食之亦以作粉食之厚人腸胃不饑爾雅所謂之芍是也衍義曰今人謂之勃臍皮厚色黑肉硬白者謂之豬勃臍皮薄色澤淡紫肉軟者謂之羊勃臍此二種藥中罕用荒歲人多採以克糧也

地

圖經曰處處水田中皆有之

時

生二月採三月三日十月取

收

暴乾用根

色

紫黑**味**甘苦**性**微寒**氣**氣薄味厚

臭

香**主**清胃熱

製

生用或搗

作

治

療孟詵云消風毒除胸中實熱氣可作粉食明耳目日華子云治黃疸開胃下食服金石藥

人食之良丹

禁

患冷氣人不可生食食之令腹脹氣滿小兒秋食臍下當痛

解

石丹

毒

茨菰

有毒一云無毒

泥生

茨菰主百毒產後血悶攻心欲死產難胎衣不出擣汁一升服之。莖葉擣爛如泥塗傅諸惡瘡腫及小兒遊瘤丹毒以冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上

腫便消退甚效

名醫所錄

名

白地栗芽剪刀草

河鳧茨

槎尾草

苗

經圖

曰葉如剪刀形莖薜似嫩蒲又似三稜苗甚軟其色深青綠每叢十餘莖內抽一兩莖莖上分枝開小白花四瓣藥深黃色根大者如杏小者如杏核色白而瑩滑人採煮食之味甘美而無毒也福州別有一種

小異三月生花四時採根葉亦治癰腫地圖經曰生江湖及京東近水河溝田中今處處皆有之

時生春生採正二月取根五收暴用根及質類芋色

黃白味甘微性寒氣氣薄味厚臭香治療日華子云葉

禁不可多食發虛熱及腸風痔瘻崩中帶下瘡癰煮生薑以禦之常食之令人患脚又發脚氣癰緩風

損齒令人失顏色皮肉乾燥卒食之令人嘔木孕婦亦不宜服

果之木

枇杷葉無毒

植生

枇杷葉主卒腕不止下氣名醫**苗**圖經曰木高丈餘葉作驢耳形背有

所錄

毛其木陰密婆娑可愛四時不凋盛冬開白花至四
五月而成實故謝瞻枇杷賦云稟金秋之青條抱東
陽之和氣肇寒葩之結霜成炎果乎纖露是也其實
作棣如彈丸黃色微有毛皮肉甚薄中核如小栗其
性味與葉
地 **圖經曰**襄漢吳蜀閩嶺南北二
川皆有之 **道地** 眉州江南西湖 **時** 生春
不同也

新採不拘時
收 暴用 葉子木 質 類奔草葉 背有毛 色 青 味 苦
葉 取葉

性 平 **氣** 氣薄味 厚陰也 **臭** 香 **主** 肺氣 渴疾 **製** 雷公云凡使採得後
乾者三葉重一兩是氣足堪用使麤布拭令毛盡用

甘草湯洗一遍却用綿再拭令乾每一兩以酥一分
炙之酥盡為度

治 療藥性論云葉和胃氣冷嘔噦不
剉碎或煮汁用 止 日華子云葉止產婦口乾。

實潤五臟 **別錄云**葉消肺風瘡胸面 **倉** 葉合木通欬
上瘡 **圖經曰**木白皮止嘔逆不下食 冬花紫苑杏

仁桑白皮等分大黃減半為末蜜丸含禁去毛不淨
化療肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞禁射人肺令
欬不已。實久食發痰熱。子和
熱炙肉及熱麪食患熱毒黃病

荔枝子

無毒

植生

荔枝子主止渴益人顏色

名醫所錄

苗

圖經曰木高二三丈自徑尺至於合

抱頗類桂木冬青之屬葉蓬蓬然四時榮茂不凋二
三月開青白花狀若冠之蕤纓三四月結實如松花
之初生者殼若羅文初青漸紅肉淡白如肪玉味甘
而多汁五六月成熟其木大者子至百斛白暴荔枝
并蜜煎荔枝肉俱為上方之珍果白暴者不失真味
其市者多用雜色荔枝入鹽梅暴之而皮深紅味亦
少酸殊失本真又有焦核荔枝味更甜美或云是木
生背陽結實不完就者白暴之尤佳又有綠色蠟色

皆其品之奇者本土亦自難得其蜀嶺荔枝初生亦小酢肉薄不堪暴花及根亦入藥此木以荔枝為名者以其結實時枝弱而蒂牢不可摘取以刀斧割利其枝故以為名耳蔡君謨荔枝譜其說甚詳

圖經曰生嶺南及巴中今蜀渝涪州興化

軍及二廣川郡皆有之道地閩中者佳

五月六

月取

收暴用實核色赤味甘性平氣厚於味臭

香主生津止渴治療別錄云消煩渴頭重心躁背膊

水煮補別錄云通神益含核火煨末合酒服

含差智健氣悅顏色止心痛及小腸氣

瘡解食過多發熱者以蜜漿解之

乳柑子無毒

植生

乳柑子主利腸胃中熱毒止暴渴利小便

名醫所錄
苗
經圖

日樹若橘樹其實亦類橘而圓大皮色生青熟黃赤未經霜時尤酸霜後甚甜故名柑子又有沙柑青柑山柑體性相類惟山柑皮療咽痛餘者不甚用**衍義**
日乳柑子今人多作橘皮售於人不可不澤也柑皮不甚苦橘皮極苦至熟亦苦若以皮緊慢分別橘與柑又緣方宜各不同亦互有緊慢者也**地**
經圖

日生嶺南及江南**時**
生四月葉採十月
收
暴乾
用
皮
質

有之出西戎者佳**類**橘而**色**
生青熟黃赤
味
甘
性
大寒
氣
氣之薄者
臭
香
主

清胃熱**治**
療圖經曰核作塗面藥日
滄
皮末合酒服
止煩渴**治**
華子云皮作湯消酒渴
滄
療產後肌浮

酒毒或醉昏悶煩渴**禁**
多食令人脾冷發癰癖大腸洩多食令人肺躁冷中

發瘰癧脾腎冷人食其肉
多致臟寒或洩利發陰汗

解丹石毒

果之草

甘蔗

無毒

叢生

甘蔗主下氣和中助脾氣利大腸

名醫所錄

名

崑崙蔗

蔗竹

蔗

苗

圖經曰此有二種一種似荻節疎而細短者謂荻蔗一種似竹蠹長者謂之竹蔗又廣州出一

種數年生皆如大竹長丈餘今江澤閩廣蜀川所生大者亦高丈許人取竿汁以為沙糖是也陶隱居云蔗有兩種赤色名崑崙蔗白色名荻蔗出蜀及嶺南為勝並煎為沙糖今江東甚多而劣於蜀者味亦甘

美

地

圖經曰出江東為勝廬陵亦有

時

生春生採八月

九月取莖用莖色白味甘性平氣厚於味臭香主除熱

治療日華子云利大小腸下氣痢消痰除心煩補日熱別錄云搗汁服主發熱口乾小便澀華

子云補倉搗汁七升合生薑汁一升相和為三服主脾益氣胃反朝食暮吐暮食朝吐或旋旋吐者

禁不可共酒食令人發痰解毒

石蜜無毒

煎鍊成

石蜜主心腹熱脹口乾渴性冷利名醫所錄名乳糖地經

日此即乳糖也鍊沙糖和牛乳為之可作餅塊唐本

注云用水牛乳米粉乃得成塊西戎來者佳江左亦

有殆勝蜀人云用牛乳汁和沙糖煎之作餅堅重此

與蟲部石蜜同名而異類也孟詵云波斯國來者良

東吳亦有此皆煎甘蔗汁及牛乳汁則易細白耳衍
義曰川浙最佳其味厚其他次之煎鍊成以銅象物
達遠至夏月及久陰雨多自消化土人先以竹葉及
紙裹外用石灰埋之仍不得見風遂免今人調乳糖
其作餅黃白色者謂之收包裏勿色黃味甘性寒氣
捻糖易消化入藥至少氣之薄者臭香主生津治療孟詵云目中熱膜明日
陽中之陰合棗肉巨勝子末爲丸含
之潤肺氣助五臟津液

沙糖無毒

沙糖主心腹熱脹口乾渴功體與石蜜同而冷利過

之名醫地圖經曰出蜀地西戎江東並有之蔗有荻
所錄蔗竹蔗於經霜後人取竹蔗竿其汁以爲

沙糖今泉福吉廣州多作之荻蔗惟蜀川煎作稀糖亦堪噉商人所貨者其糖多以荻蔗爲之而竹蔗者少也〔衍義曰〕沙糖次於石蜜蔗汁清故費煎鍊致紫黑色今醫家治暴熱多以此物爲先導小兒多食則損齒土制水也及生蟻蟲裸蟲屬土故因甘遂生

〔收〕

以磁器貯之

〔色〕

紫黑

〔味〕

甘

〔性〕

寒緩

〔氣〕

氣之薄者陽中之陰

〔臭〕

香

〔主〕

心熱口渴渴

〔製〕

去葉用笮取汁煎鍊成糖去滓用

〔治〕

療

日華子云潤心肺殺蟲

〔衍義〕

〔倉〕

白糖合酒煮服治腹緊

〔禁〕

多食令人

日退心肺大腸熱及暴熱

心痛生長蟲消肌肉損齒發疳蟹不宜與鯽魚同食成疳蟲與葵同食生流癖與笋同食使笋不消成癥

身重不

〔解〕

酒毒

能行履

果之木

梔

無毒

植生

梔音卑主壓石藥發熱利水解酒熱久食令人寒中

去胃中熱

名醫所錄

苗

圖經曰似柿而青黑閑居賦云梁侯烏梔之柿是也但可生噉不堪

乾用諸柿食之皆美而益人惟梔更壓丹石毒爾然其性冷復甚於柿故散石家熱噉之亦無嫌不入

藥用惟可

地

圖經曰生江淮南及

時

生春生

採十月

作漆甚妙

地

宣歙荆襄閩廣諸州

時

葉

取實

用實

色

青黑

味

甘

性

寒

氣

氣之薄者

臭

朽

主

清胃熱

治

療日華子云

止渴潤

忌

不宜與蟹同食令

解

壓丹

石毒

心肺除腹臟冷熱

忌

人腹痛并大瀉

解

壓丹

石毒

四種陳藏器餘

懸鈎根皮味苦平無毒主子死腹中不下破血殺蟲
毒卒下血婦人赤帶下久患痢不問赤白膿血腹痛
並濃煮服之子如梅酸美人食之醒酒止渴除痰唾
去酒毒莖上有刺如鈎生江淮林澤取莖燒爲末服
之亦主喉中塞也○鈎栗味甘平主不饑厚腸胃令
人肥健子似栗而圓小生江南山谷樹大數圍冬月
不凋一名巢鈎子又有雀子小圓黑味甘久食不饑
生高山子小圓黑又有櫛音諸子小於櫛子味苦澀止

瀉痢破血食之不饑令健行木皮葉煮取汁與產婦
飲之止血皮樹如栗冬月不凋生江南子能除惡血
止渴也○石都念子味酸小温無毒主痰嗽噦氣生
嶺南樹高丈餘葉如白楊花如蜀葵正赤子如小棗
蜜漬爲粉甘美益人隋朝植於西苑也○摩厨子味
甘香平無毒主益氣潤五臟久服令人肥健生西域
及南海子如瓜可爲茹異物志云木有摩厨生自斯
調厥汁肥潤其澤如膏馨香麝射可以煎熬彼州之

人仰以爲儲斯調國名也○海藥云

謹按異物志云生西域三月開

花四月五月結實如瓜許益氣安神養血生肌久服健人也

本草品彙精要卷之三十三

本草品彙精要卷之三十四

果部下品

三種神農本草經

朱字

五種名醫別錄

黑字

一十種宋本先附

汪云
宋附

七種今補

一種今移

四種陳藏器餘

已上總三十種

桃核仁

花鬼毛 煮皮
葉膠實等附

杏核仁

花附

安石榴

根殼附

梨

鹿梨 驚梨
消梨附

林檎

宋附

李核仁

根皮附

楊梅

宋附

胡桃

宋附樹皮附

獼猴桃

宋附

海松子

宋附

柰

菴羅果

宋附

橄欖

音覽宋附
核中仁附

楹棹

宋附

榛子

宋附

龍眼

自木部
今移

椰子皮

宋附漿等附
自木部今移

榧實

自木部
今移

香圓

今補

馬檳榔

今補

平波

補今

八檐仁

補今

銀杏

補今

株子

補今

必思答

補今

棠毬子

自外經
今移

四種陳藏器餘

君遷子

韶子

探子

諸果有毒

本草品彙精要卷之三十四

果部下品

果之木

桃核仁

無毒

植生

桃核仁

出神農本經

主瘀血血閉癥瘕邪氣殺小蟲○桃

花殺疰惡鬼令人好顏色○桃鳧微溫主殺百鬼精

物○桃毛主下血癥寒熱積聚無子○桃蠹殺鬼邪

惡不祥

以上朱字神農本經

桃核仁止欬逆上氣消心下堅除

卒暴擊血破癥瘕通月水止痛○桃花味苦平無毒

主除水氣破石淋利大小便下三蟲悅澤人面○桃

毛味苦療中惡腹痛殺精魅五毒不祥○桃毛平帶

下諸疾破堅閉刮取毛用之○桃蠹食桃樹蟲也○

莖白皮味苦辛無毒除邪鬼中惡腹痛去胃中熱○

葉味苦辛平無毒主除尸蟲出瘡中蟲○膠鍊之主

保中不饑忍風寒以上黑字 崑崙桃 油桃 山

桃名桃奴名醫所錄 桃 金桃 餅子桃

泉景用 圖經曰木高丈餘三月開紅花有深淺 二色漸敷青葉如柳葉而大花謝始結

實漸大如杏六七月成熟圃人欲其肥美詭異多以他木接之殊失本性此種不宜用也入藥當以自然生成而不經接者則不失本性而治療有功也其實已乾着木上經冬不落此名桃鳧又名桃奴正月採之以中實者良衍義曰桃核仁桃品亦多京畿有油桃光小於衆桃不益脾有小點斑而光如塗油山中一種正是月令中桃始華者但花多子少不堪啗惟堪取仁唐文選謂山桃發紅萼者是矣又太原有全桃色深黃西京有崑崙桃深紫紅色此二種尤甘又餅子桃如今之香餅子如此數種入藥惟以山中自生者爲正蓋取走泄爲用不取肥好者雷公云用鬼臚臚勿用乾桃子其鬼臚臚只是千葉桃花結子在樹上乾不落者於十一月內採得可爲神妙東京賦云上古有神荼與鬱壘兄弟二人桃樹下閱百鬼無道理者縛以葦索而飼虎今人作地圖注曰生泰山桃符板云左神荼右鬱壘者是也地川谷今處處有

之道地京東及
陝西出者佳
時生三月採正月取梟三月三
開花日取花秋取仁
收乾陰

用仁花梟毛蠹莖
葉膠實及白皮
質類杏仁
色皮黃肉白
味苦甘性平洩
氣

味厚於氣
陰中之陽
臭微
主破血
行手厥陰經
製雷公云凡使
須擇去皮用

白木烏豆二味和桃仁於坩堝子中煮一伏時
後漉出用手擘作兩片其心黃如金色任用
治療

圖經曰桃花貼面上瘡黃水出并眼瘡。桃梟除中
惡毒氣蠱症。實上毛刮取之治女子崩中唐本注

云桃膠主下石淋破血中惡症忤。花主下惡氣消
腫滿利大小腸藥性論云桃符主中惡孟詵云桃仁

殺三蟲止心痛。葉治女人陰中生瘡如蟲齧疼痛
者可生搗綿裹內陰中日三四易瘥。花曬乾杵末

以水服二錢七小兒半錢治心腹痛。白毛及膠主
惡鬼邪氣。桃符及奴主精魅邪氣日華子云樹上

自乾桃實治肺氣腰痛除鬼精邪氣破血。葉治惡
氣小兒寒熱客忤別錄云桃膠如彈丸含之治虛熱
渴。桃葉治腸痔大腸常下血杵取一斛蒸之內小
口器中以下部搗上坐蟲自出。桃枝上乾不落桃
子燒灰水服療胎下血不出。桃葉治諸蟲入耳熟
授塞兩耳即出。桃白皮治狂狗咬人以一握水煎
服。桃樹蟲屎治瘟病令不相染爲末水服方寸七
○東行桃枝煮湯浴治天行時疫癘者。東引桃枝
白皮一握水煮服半升主鬼疰心腹痛補日華子云
不可忍。燒桃仁傳治產後陰腫痛。桃益色。○

桃蠹食之肥悅人顏色別錄云戊子日取東引倉桃
桃枝二寸枕之補心虛治健忘令耳目聰明

花

漬酒飲之除百病益顏色。桃仁去皮尖合粳米煮
粥食之主上氣咳嗽胸膈痞滿氣喘。桃仁去皮尖
杵碎煮汁煮粥空心食之主尸疰鬼氣咳嗽疰癘注
氣血氣不通日漸消瘦。桃仁一升去皮尖炒令煙

出熱研如脂膏合酒三升攪令相和一服取汗療風
勞毒腫痛攣痛或牽引小腹及腰痛不過三瘥。桃
仁三十枚別研合蜚蟲三十枚去翅水蛭二十枚各
炒以大黃一兩同爲末再與桃仁同搗令勻煉蜜丸
如小豆大桃仁湯下療傷寒八九日間發熱如狂不
解小腹滿痛有瘀血者利下瘀血惡物便愈未利再
服。收未開花陰乾與桑椹紫者等分作末以
豬脂和先取灰汁洗去瘡痂卽塗藥治瘡瘡
酸多食令人有熱

杏核仁

有毒

植生

杏核仁

出神農
本經

主欬逆上氣雷鳴喉痹下氣產乳金

瘡寒心奔豚

以上朱字
神農本經

驚癇心下煩熱風氣去來時

行頭痛解肌消心下急○花味苦無毒主補不足女

子傷中寒熱痺厥逆

以上黑字
名醫所錄

名

金杏
木杏

漢帝杏
白杏

苗

圖經曰其木高丈餘二月敷青葉如梅葉圓而尖三月開紅花四月結實五六月熟大如黃梅其實有數種黃而圓者名金杏相傳云出濟南郡之分流山彼人謂之漢帝杏今近都多種之熟最早其扁而青黃者名木杏味酢不及金杏其仁入藥今以東來者為勝衍義曰杏仁聯蓄為果其深赭色核大而匾者為金杏此等須接食之味美其他皆不逮也如山杏輩用仁入藥當以不接者為佳又有白杏至熟色青白或微黃其味甘淡而不酸耳

地

圖經曰生濟南及晉州山谷今處處有之

時

生二月
採

五月取核

收

焙乾

用

實仁

質

類桃核仁

而圓小

色

皮黃

味

甘

性

溫

氣

苦

氣

溫

氣

氣味俱厚
陽中之陰

臭

香

主

散結潤燥
定喘寧嗽

行

手太陰經

助

得火良

反

惡黃芩

耆葛根

製

雷公云

凡使須以沸湯浸少時去皮膜及

畏蘘草

尖擘作兩片用白火石并烏豆杏仁三件

於鍋子中下東流水煮從已至午其杏仁色褐黃然

用每修一斤用白火石一斤烏豆合木旋添勿令闕

治

療

藥性論云

除腹痹不通發汗及瘟病與心下急

滿痛并心腹煩悶及肺氣咳嗽上氣喘促

器云殺蟲燒令煙未盡細研如脂物裏內蠶齒孔中

亦主產門中蟲瘡瘻不可忍者。杏酪濃煎如膏服

之潤五臟

含

合天門冬煎潤心肺。合酪作湯益潤

去痰嗽

聲氣湯經宿即動冷氣。去皮搗和雞

子白晝臥塗面明早以煖清酒洗之療面疔。以三

分去皮尖熬合桂末一分和如泥取李核大綿裹含

細細咽之日午夜三療卒瘕及利咽喉去喉痹痰唾

咳嗽喉中熱結生瘡。合橘皮桂心訶梨勒皮為丸

療心腹中結伏氣。湯浸研一升以水一升半翻復
絞取稠汁。人生蜜四兩甘草一莖約一錢銀石器中
慢火熬成稀膏。瓷器盛食後夜卧入酥沸湯點一錢
七服治肺燥喘熱大腸祕潤澤五臟如無上證更入
鹽爲〔禁〕生熟喫俱得半生熟殺人實味酸不可多食
佳〔禁〕傷神損筋骨小兒尤不可食多致瘡癰上膈
熱雙仁者殺人〔解〕錫毒胡粉毒
狗食之亦死〔解〕食狗肉中毒

安石榴

無毒

植生

安石榴主咽燥渴。酸實殼療下痢止漏精。東行

根療虬蟲寸白

名醫所錄

〔名〕

丹若

〔苗〕

〔圖經曰〕

木不甚高大枝

柯附幹自地便能作叢

種極易息折其條盤土中遂生花有黃赤二色實亦

有甘酢二種甘者可食酢者入藥陸機書云張騫使

西域於塗林國所得者是也又一種山石榴形頗相類而絕小不作房生青齊間甚多不入藥但蜜漬以當果或寄京下甚美衍義曰安石榴有酸淡兩種旋開單葉花旋結實實中子紅秋後經雨則自圻裂道家謂之三尸酒云三尸得此果則醉又有一種子白瑩澈如水晶者味亦甘謂之水晶石榴惟酸石榴皮合斷下藥仍須老木所地圖經曰本生西域今處處結及收之陳久者佳

時 生春生採五月取花七葉月八月取實收陰乾陳用子皮色黃味

甘**性**溫氣氣厚味薄臭香主止痢製雷公云凡使石酸**收**陽中之陰

先用漿水浸一宿至明漉治療圖經曰東行根并殼出其水如黑汁方可用人殺蟲及染鬚髮口

齒等藥○花百葉者主心熱吐血及衄血等乾之作末吹鼻中立瘥藥性論云皮味酸能除筋骨風腰脚

不遂行步學急疼痛瀝腸止赤白下痢。取汁止目
淚下并漏精。根青者入染鬚方。陳藏器云石榴子
止渴。別錄云酸石榴皮燒赤為末。倉酸石榴皮炙令
服治赤白痢下水穀宿食不消。黃杵末合棗肉
為丸空腹三九日二服治赤白痢腹痛。酸石榴
皮末合茄子枝湯調服療糞前有血令人面色黃。禁
多食損齒令黑及損人肺。忌犯鐵器。

梨無毒

植生

梨多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食

名醫所錄名乳梨

水梨

紫煤梨

茅梨

桑梨

鹿梨

紫花梨

消梨

青梨

甘棠鰓兒梨

苗

圖經曰梨之種類殊

別醫家相承用乳梨鵝梨乳梨出宣城皮厚而肉實
其味極長鵝梨出近京州郡及北都皮薄而漿多味

差短於乳梨惟香則過之其餘水梨消梨紫煤梨赤梨甘棠鰕兒梨之類甚多俱不聞入藥也又有青梨茅梨並不任用又有桑梨惟堪蜜煮食之生食不益人冷中不可多食又有紫花梨療心熱唐武宗有此疾百醫不効青城山邢道人以此梨絞汁而進帝疾遂愈後復求之苦無此梨常山忽有一株因緘實以進帝多食之解煩燥殊効歲久木枯不復有種者今人不得而用之又有江寧府信州出一種小梨名鹿梨葉如茶根如小拇指彼處人取其皮治瘡癰及疥癩甚効近處亦有但採其實作乾不聞入藥也

圖經曰出宣城及近京
州郡北都今處處有之
時生春生採八月九月取實用實色

黃
味酸甘微
性寒
氣緩陰中之陽
臭香
主除熱嗽止煩渴製去皮核笮

汁
治療圖經曰鵝梨除咳嗽熱風痰實○紫花梨療心熱○鹿梨根皮治瘡癰疥癩甚効○梨葉

主霍亂吐下煮汁服亦可作煎治風唐本注云梨削貼湯火瘡不爛止痛妊婦臨月食之易產○消梨主客熱中風不語并傷寒發熱祛邪止驚咳嗽消渴亦利大小便日華子云梨消風療咳嗽氣喘熱狂又除賊風胸中熱結○作漿吐風痰孟詵云梨止心煩又胸中痞塞熱結者可多食生梨卽通卒闇風失音不語者生搗汁一合頓服之日再服止衍義曰病酒煩渴人食之甚佳別錄云小兒寒疝腹痛大汗出濃煮梨葉汁七合頓服以意消息可作三四度飲之○嚼梨汁傳蠟蝮尿瘡黃水出乾卽易之倉梨一作五十孔每孔內川椒一粒以麪裹於熱火灰中煨令熟出停冷去椒食之療卒欬嗽或去核內酥蜜麪裹燒令熟食之○搗汁一升合酥一兩蜜一兩地黃汁一升緩火煎細細含咽凡治嗽皆須待冷喘息定然後方食如熟食之反傷矣○梨一顆搗絞取汁合黃連三枝碎之綿裏漬令色變仰卧注目中療卒患

赤目胛肉坐卧痛。梨三枚用水二升煮汁一升去滓合粳米一合煮粥食之療小兒心臟風熱昏憒躁悶不食。禁多食動脾氣金瘡及產婦不可食。解丹石熱氣。

林檎無毒

植生

林檎不可多食令人發熱泄氣令人好睡發冷痰生

瘡癰脉閉不行

名醫所錄名來禽花苗圖經曰其樹似紅沙果柰樹實比柰差

圓六七月成熟亦有甘酢二種甘者早熟而味肥美酢者差晚須熟爛乃堪噉陳士良云此有三種大長者為柰圓而夏熟者為林檎地圖經曰舊不著取出小而味澁秋熟者為柰也州土今在處有之

收

生春生採六月七月實質如柰而色淡味酸性溫葉月取實

氣氣厚味薄
陽中之陰
臭香
主消渴
製竹取汁用
治療
日華子云下

痛消痰孟詵云
止消渴別錄云
止穀痢洩精并倉
末

水痢小兒痢。東行根治白蟲虬蟲消渴好睡倉
末

合醋傅療小兒閃癖禁
不可多食令人

頭髮堅黃瘰癧瘰癧瘦禁
心中生冷痰

李核仁無毒

植生

李核仁主僵仆躋瘀血骨痛。根皮大寒主消渴止

心煩逆奔氣。實除痼熱調中名醫青李黃李
所錄房陵李駸

赤李赤李綠李
馬肝李朱仲李趙
苗圖

麥李御李子
南居李瘞接慮李

實木高丈餘至春敷葉如杏葉而尖開白花春末結
實五六月成熟李之類甚多爾雅云休李之無實者

一名趙李

祖承

接慮李即今之麥李也細實有溝

道與麥同熟故名之駁赤李其子赤者是也又有青

李綠李赤李房陵李朱仲李馬肝李黃李散見書傳

美其味之可食陶隱居云皆不入藥用惟姑熟所出

南居李解核如杏子者為佳今不復識此醫家但用

核若杏子形者根皮亦入藥用衍義曰北地所產株

大者高及丈今畿內小窪鎮一種最佳堪入貢又有

御李子如櫻桃許紅黃色先諸李熟此李品甚多然

天下皆

地

圖經曰舊不著所出州土

時

生四月採五

有之

地

今處處有之道地蜀州

時

結實六

月

收

用

仁花實

質

類杏仁

色

黃

味

苦

性

平

氣

味厚

取

乾

用

及根皮

質

而小

色

赤

味

苦

性

洩

氣

於氣

陰中

主

下水氣

製

去殼

治

療藥性論云仁除女子小

治

腹腫滿并踠折骨疼肉

之陽

主

除腫滿

製

取仁

治

腹腫滿并踠折骨疼肉

治

傷利小腸下水氣除腫滿

傷利小腸下水氣除腫滿

主

除腫滿

製

取仁

治

腹腫滿并踠折骨疼肉

治

根皮治腳下氣主熱毒

煩躁

主

根煮汁止消渴

製

日華子云

治

根涼無毒主赤白

治

根涼無毒主赤白

痢濃煎服。○葉平無毒治小兒壯熱疳疾驚癇作浴
湯孟詵云李實主女人卒赤白帶下或李樹東面皮
去皺皮炙令黃香水煮汁去滓服亦驗。○生李實去
骨節間勞熱。○牛李煮濃汁含之治罌齒脊骨有疳
蟲可後灌此汁更空腹服補日華子云
一盞別錄云肝病宜食
雞子白和如稀餳塗面上至曉以淡漿水洗之後塗
胡粉療面黥黑子。○核仁和麪作餅子空腹食之少
頃當瀉
療鼓脹
禁
痰瘧多食令人虛熱和蜜食之損五臟合
漿木喫令人
霍亂瀝氣

楊梅

無毒

植生

楊梅主去痰止嘔噦消食下酒乾作屑臨飲酒時服

方寸七止吐酒

名醫所錄

名 聖生梅 白蒂梅

苗

圖經曰樹若荔枝樹葉細陰青形似

水楊其實生青熟紅紫肉在核上而無皮殼南人以蜜漬或淹藏可以寄遠誠果品中之珍味也今醫方

鮮**地**

圖經曰生江南及嶺南山各皆有之

時

生四月採五月六月取實

用

色

生青熟紫

味

酸甘

性

溫緩

氣

氣厚味薄陽中之陰

臭

香

主

止渴消痰

治

療日華子云

止嘔逆吐酒。皮根煎湯洗惡瘡疥癬孟詵云和五藏滌腸胃除煩懣惡氣燒灰服亦能止痢陳藏器云

止渴

別錄

倉

用鹽藏楊梅合核杵之如泥成挺子以竹筒中收之治一切傷損止血生肌無

云去痰實

倉

竹筒中收之治一切傷損止血生肌無

癥瘕絕妙遇破處用少許填之此藥之功神驗

禁

多食令人發熱甚能損齒及筋

忌

葱生

胡桃

無毒

植生

胡桃食之令人肥健潤肌黑髮取瓢燒令黑末斷煙

和松脂研傅瘰癧瘡又和胡粉爲泥拔白鬚髮以內

孔中其毛皆黑多食利小便能脫人眉動風故也去

五痔外青皮染髭及帛皆黑○樹皮止水荊可染褐

仙方取青皮壓油和詹糖香塗毛髮色如漆其木春

斫皮中出水承取沐頭至黑

名醫所錄
苗
圖經曰大株厚葉多陰實亦有

房秋冬乃熟外有青皮包之胡桃乃核也核中穰爲胡桃肉此果本出羌胡漢張騫使西域還始得其種植之秦中後漸生東土故曰陳倉胡桃薄皮多肌陰平胡桃大而皮脆擊之易碎江表亦嘗有之梁沈約

集有謝賜樂遊園胡桃啟乃其事也今地圖經曰生

京東亦有其種而實不佳南方則無表間亦多有之時生四五採秋冬收暴用肉皮色肉白

道地北土者佳月生取實乾皮青味甘性平氣緩陽中之陰臭微主潤肌製凡使去殼湯

薄苦療日華子云潤肌肉益髮孟詵云除風冷令皮用治人能食不得併漸漸食之通經脉潤血脉

黑鬢髮又服法初一日一顆五日加一顆至二十顆止之常服骨肉細膩光潤能療一切痔別錄云穰燒

令黑杵如脂倉肉合破故紙搗篩蜜丸如梧桐子大傳火燒瘡朝服三十丸補下元○肉搗和酒溫

頓服療壓撲損傷○肉和細米各等分煮粥頓服療石淋便中有石子○肉一箇合炒橘核為末一錢七

溫酒調服以知為度禁多食動痰飲及發風解食酸療患酒瘡風鼻上赤過夏至則不堪食齒齷

初舉細嚼
此解之

果之走

獼猴桃

無毒

蔓生

獼猴桃止暴渴解煩熱冷脾胃動洩辟壓丹石下石
淋熱壅反胃者取汁和生薑汁服之○枝葉殺蟲煮

汁飼狗療癆也

名醫所錄

名

藤梨

木子

苗

圖經曰藤生著樹葉圓有

毛實似雞卵大皮褐色經霜始甘美可食

衍義曰十

月爛熟色淡綠生則極酸子繁細其色如芥子枝條

柔弱高二三丈多附木而生淺山傍道則有

地

圖經曰生

存者深山則多為猴所食皮亦堪作紙也

山谷衍義曰出永時生春生採十月實質類難色

興軍南山甚多葉取實用實質卵類難色

褐味酸寒氣薄味厚臭香主止消渴製搗汁治

療陳藏器云除骨節風癱瘓不隨長年變白野倉取

雞內痔病調中下氣。藤中汁至滑下石淋汁

合生薑汁服之主胃開。候熟收之禁多食令人

取穰和蜜作煎去煩熱亦能止消渴臟寒洩

果之木

海松子

無毒

植生

海松子主骨節風頭眩去死肌變白散木氣潤五臟

不饑

名醫圖經曰如小栗三角其中仁香美東夷所錄苗食之當果與中土松子不同海藥云食

之甚甘美味與卑占國偏桃仁相似與雲南松子
不同雲南松子似巴豆其味不厚多食發熱毒

圖經曰生春採秋**時**生春採秋**收**暴用仁**質**如小栗三角**色**白**味**甘

性小温**氣**氣厚於**臭**香**主**祛諸風**製**去皮**治**療日華

逐風癰補日華子云虛羸少氣補不足潤皮膚
寒氣肥五臟海藥云久服輕身延年不老

柰無毒

植生

柰多食令人臚音脹病人尤甚名醫**苗**謹按木高丈

二三月開紅白花四月結實漸大如林檎六七月成
熟據陳士良云此有三種長大者為柰圓而夏熟者

為林檎小而秋熟陶隱居云江南**時**生春生**採**六
味澁者為柰也乃有北國最豐**葉**月

七月
取實
收
乾
用
實
質
類
林
檣
色
紅
味
苦
性
寒
氣
薄
味
厚
陰
也

臭
香
主
益
心
氣
和
脾
胃
治
療
日
華
子
云
治
飽
食
多
肺
壅
氣
脹
孟
詵
云
卒
患
食
後
氣
不
通
生
搗

汁
服
補
孟
詵
云
補
中
焦
諸
不
耐
饑
禁
多
食
令
人
脹

菴羅果

植生

菴羅果食之止渴動風氣
名醫
苗
圖
經
曰
樹
若
林
檣
而
極
大
葉
似
茶
葉

衍義曰西洛甚多亦梨之類也其狀亦梨先諸梨熟
七夕前後已堪啗色黃如鵲梨纔熟便鬆軟入藥絕

稀
地
衍
義
曰
西
時
生
春
生
採
七
夕
前
用
實
質
類
鵝
色

黃
味
甘
性
溫
氣
厚
臭
香
主
止
渴
治
療
別
錄
云
調
婦
人
經
脉

不通丈夫營衛中血脉不補別錄云久服禁天行病

行○葉可作湯飲療渴疾令人不饑後及飽

食後俱不可食之又不可同

大蒜辛物食令人患黃病

橄欖

無毒

植生

橄

音

欖

音

主消酒療鯀

音

鯀

音

毒人悞食此魚肝迷

悶者可煮汁服之必解其木作楫撥著魚皆浮出故

知物有相畏如此也○核中仁研傅屑吻燥痛

名醫所錄

苗

圖經曰

其樹似木櫟子樹而高且端直可愛春敷

葉二月開花秋晚結實其實長寸許形似生訶子

無稜瓣南人尤重之咀嚼則滿口香久不歇山野中生者子繁而木峻不可梯緣但刻其木下方寸許內

鹽於中一夕子皆落木亦無損蘇東坡詩云紛紛青
 子落紅鹽是也其枝節間有脂膏如桃膠南人採得
 并其皮葉煎之如黑飴謂之攪糖用膠船著水益乾
 牢於膠漆邕州又有一種波斯橄欖色類相似但其
 核作三瓣可**地****圖經**曰生嶺南交趾及邕州**時****生**春
 以蜜漬食之**棗****採**八月九月**收****暴****用****實****核****質****類**生詞子**色****青****味****酸****性****甘****性****溫****氣****厚****味****薄****臭****香****主****止****渴****製****去****核****治****療****日****華****子****云****收****陽****中****之****陰****解****諸****毒****及****主****鯢****魚****毒****以****汁****服****之****此****魚****汁****嚙****治****魚****鯢****肝****子****毒****人****立****死****惟****此****木****能****解****及****悞****食****鯢****鮓****肝****至****迷****悶****者****飲****其****汁****立****瘥**

楡梲

無毒

植生

楹梲主温中下氣消食除心間醋水去臭辟衣魚醫名

所苗圖經曰樹若林檎花白綠色有香其實似榧子

錄而小但膚慢而多毛初熟時其氣氣馥人將致

衣笥中亦香諸果中惟地圖經曰生關陝今孟州皆

此多生蟲少有不艸者有之道地沙苑出者更佳

時生春生採秋取葉實收暴用實質類榧子色淡味酸性

微温氣氣厚味薄臭香主下氣製拭去上治療圖經

緩氣陽中之陰主消食製浮毛用治日消

胸膈中積食去醋水下氣止渴及主霍亂轉筋並煮

汁飲之常食亦能去心間醋痰。皮搗末傅瘡上黃

水日華子云禁食之不去毛損人

除煩渴治氣禁肺多食澁血脉

榛子無毒

叢生

榛子主益氣力寬腸胃令人不饑健行

名醫所錄

苗

圖經曰樹

高丈許子如小栗軍行食之當糧中土亦有鄭注禮

云榛似栗而小關中鄜坊甚多桂陽一種莘榛音叢生

實大如杏子中仁皮子形

地

圖經曰生遼東山谷及

色與栗無異也但差小耳

桂陽新羅關中鄜坊皆

有**時**

生春採秋取實

收

用

色

殼褐肉白

味

甘

性

平

氣

厚

於味陽中之陰

臭

香

主

和胃寬中

製

去皮殼

治

療日華子云止饑調中開胃

龍眼

無毒

植生

龍眼

出神農本經

主五臟邪氣安志厭食久服強魂聰明

輕身不老通神明

以上朱字神農本經

除蟲去毒

以上黑字名醫所錄

名

益

苗

圖經曰

木高二丈許似荔枝而葉微小凌冬不

智

凋

春末夏初生細白花七月而實成殼青黃色

形圓如彈丸核若無患子而不堅肉白有漿甚甘美

其實極繁每枝常二三十枚荔枝纔過龍眼即熟故

南人目為荔枝奴一名益智以其味甘歸脾

地

圖經

而能益智耳草部自有益智子非此物也

地

曰生

南海山谷今閩

時

生春末夏

採

八月

收

暴

用

實

質

圓形

廣蜀道皆有之

時

初開花

取實

收

乾

用

實

質

圓形

如彈

色

殼青黃

味

甘

性

平

氣

氣厚於

臭

香

主

益脾

治

安志

丸

肉白

色

殼青黃

味

甘

性

平

氣

氣厚於

臭

味陽也

臭

香

主

益脾

治

安志

療

蜀本云

除

蠱

毒去三蟲

椰子皮

無毒

植生

椰子皮止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之○殼中肉

益氣去風○漿主消渴塗頭益髮令黑飲之得醉

醫名

所

苗

圖經曰

木如椶櫚亦似杭柳無枝條高數丈葉

錄

在木末如束蒲實大如瓠垂於枝間如掛物實

外有麤皮如椶包次有殼圓而且堅裏有膚至白如

猪肪厚半寸許味似胡桃膚裏有漿四五合如乳飲

之冷而氣薰人多取殼為器南人取肉糖蜜漬之作

果寄遠甚佳衍義曰椰子開之有汁如乳極甘香別

是一種氣味中又有一塊瓢形如瓜萐上有細壠起

亦白色但微虛紋若婦人裙褶其味亦如汁又着殼

一重白肉削取之皆可與瓢糖煎為果汁色如白酒

其味如瓢然謂之酒者好事者當日強名之取其殼

為酒器如酒中有毒則酒沸起今人地圖經曰生安

皆漆其裏則全失用椰子之意也南今嶺南州

郡亦有之海藥

時

生

春

採

九月

十

收

陰

用

皮根

質

類

生月取

乾

肉漿

大

腹皮而極大
色白黃
味苦
性平
氣味厚於氣
臭朽
主止逆血
製

日華子云
治療海藥云柳子漿止消
禁汁多食
炙剉碎用
渴吐血消水腫去風
動氣

榧實 無毒
植生

榧 音匪
實主五痔去三蟲蠱毒鬼疰
名醫所錄
苗 唐本注云其樹大連

抱高數仞葉似杉其木如栢作松理肌細軟堪為器
用即爾雅所謂披杉也
衍義曰榧實大如橄攪殼色

紫褐而脆其中子有一重蠹黑衣
地 圖經曰生永昌
其仁黃白色嚼久味漸甘美也
陶隱居云東陽

諸郡亦有之
時 生春採秋取
收 暴用仁
質 類橄
色 殼紫褐
仁黃白

味 甘
性 平
氣 氣厚於味
臭 香
主 消宿食
製 去殼
治 療

陶隱居云除寸白蟲孟詵云補孟詵云助筋禁衍義
多食令人不發病能食消穀 骨明目輕身禁日食
之過多
則滑腸

香圓

無毒

植生

香圓主下氣開胸膈○皮去氣除心頭痰水

名醫所錄名

枸櫞

苗

圖經曰樹似橘而葉大其實狀如小瓜皮

香櫞子

若橙而光澤可愛肉甚厚味雖短而香氣

大勝於柑橘之類置衣笥中則數日香不歇今

地圖

南方有之謂之香櫞子或將至都下人亦貴之

曰生閩廣江西

時生四月採九月十

月取實

收

陰

用

實

色

黃皮

今南方多有之

開花

月取實

收

陰

用

實

色

黃皮

肉

味

辛

性

溫

氣

氣厚味薄

臭

香

陽中之陰

馬櫝榔

無毒

植生

馬櫝榔主催生若難產臨死者用仁細嚼井花水送

下須更立出或產母兩手各握二枚而惡水自下名醫

所錄苗樹高一二丈葉似棟葉兩兩相對三月藥生枝端開淡紅白花五出隨結實如連皮核桃而有

三五稜瓣至秋漸大如梨熟則皮黑析之每瓣有子三四枚如龍眼核其仁甘美故北人當果食之地

生北地道時生春生採八月九實實質狀如梨地雲南葉月取實乾用實而有稜

色皮黑仁白味甘苦性寒洩氣氣薄味厚臭香製去皮殼治療

別錄云生產繁者用二枚細嚼以井花水吞下其水味甜如蜜久服則子宮冷自然絕矣常食之亦不傷

人

平波

無毒

植生

平波止渴生津

出飲膳正要

苗

樹高一二丈葉如林檎葉而微圓三月開淡紅花六

七月成實亦似林檎而大生青白熟淡紅色食之甚甘美及置篋笥中香氣可愛

地

出北地

時

生

四

採

六月

七

月

取實

收

暴

用

實

色

白

味

甘

性

緩

氣

氣之薄

者

陽中

之

臭

香

八檐仁

無毒

植生

八檐仁止欬下氣消心腹逆悶

出飲膳正要

苗

樹高丈許枝葉花實

與杏無異但實差小亦可噉之核中仁食之味地出

甘美與榛子仁相似非若杏仁苦而有毒也地回田地今北時生四月採五月六收暴用仁質類杏

地亦有之圓色皮褐味甘性緩氣氣之薄者臭香製馱去殼湯小仁白陽中之陰臭香製馱去殼湯

銀杏無毒 植生

銀杏炒食煮食皆可生食發病出飲膳名鴨腳苗謹

樹高五六丈徑三四尺葉似鴨腳五六月結實如李正要白果按

八九月熟則青黃色採之浸爛去皮取核為果亦名鴨腳梅聖俞詩云鴨腳類地出宣城郡及時生五六

緣李其名因葉高是也採八月九收暴用核中色殼白肉味甘性緩氣味厚

月取實乾肉色青黃味苦性洩氣於氣

陰中之陽

臭腥

製

火煨去殼用

治

療煨熟食之止小便頻數

倉

葉為末和麴作餅煨

熟食之止瀉痢

禁

生食有小毒發病

株子

無毒

植生

株子不可多食

出飲膳正要

苗

謹按株子樹高三五尺枝葉類橘而小冬月不凋春

復繁茂四月開小白花其實有三種小而圓者謂之金豆大如彈丸者謂之金橘銳而長者謂之牛妳金柑即株子也生青熟黃人家庭院多植而翫之九月採食其清香經日不散或蜜漬作湯果寄遠人貴重之稀入藥用

地

生南山川谷及江浙荆襄湖嶺皆有之

時

生四月採九月十月取實

用

實

色

生青熟黃

味

酸甘

性

平微寒

氣

氣薄味厚陰中之陽

臭

香

必思荅

無毒

植生

必思荅主調中順氣

出飲膳正要

苗

謹按必思荅即必思忒也出回回田中樹

高一二丈葉如杏其實如桃李去肉取核仁作果食之今亦入貢焉

收

日乾

味

甘

性

緩

氣

氣之薄者陽中之陰

臭

香

棠毬子

無毒

植生

掌毬子治疾痢及腰疼皆效又能消食行結氣健胃

催瘡疹

名醫所錄

名紅山查子

海山裏果

苗

圖經曰樹高三五尺葉似杏葉而長三月

開白花隨便結實如酸棗而差匾至八九月色赤山人採之以當果食今藥中多用之以其能消食而健

脾也圖經曰生滁州今處處有之
時生春採八九月取
收日乾
用實色紅

味甘
主消食健胃

四種陳藏器餘

君遷子味甘平無毒主止渴去煩熱令人潤澤生海

南樹高丈餘子中有汁如乳汁吳都賦云平仲君遷

○海藥云謹按劉斯交州記云其實中有乳汁甜美香好微寒無毒主消渴煩熱鎮心久服耐

老輕身亦得悅人顏色也○韶子味甘溫無毒主暴痢心腹冷生

嶺南子如栗皮肉核如荔枝廣志云韶葉似栗有刺

斫皮內白脂如豬肪味甘酸亦云核如荔枝也○探子味甘澁平無毒生食主水痢熟者和蜜食之去嗽子似梨生江南吳都賦云探榴禦霜是也○諸果有毒桃杏仁雙有毒五月食未成核果令人發癰節及寒熱又秋夏果落地爲惡蟲緣食之令人患九漏桃花食之令人患淋李仁不可和雞子食之患內結不消

本草品彙精要卷之三十四